


Thriller

Michael Jackson



Tod

Sein Leibarzt Conrad Murray verabreichte Jackson am 25. Juni 2009 25 Milligramm Propofol, was schließlich zum Herzstillstand des Sängers führte. Er wurde tot in seinem Haus aufgefunden und Wiederbelebungsmaßnahmen waren vergebens. Sein Leibarzt Conrad Murray wurde wegen fahrlässiger Tötung zu vier Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Persönlichkeit

Michael Jackson war schmerzmittelabhängig aufgrund andauernder Wiederherstellungs-OPs seiner Kopfhaut nach einem Brandunfall. Zudem litt er unter starker Schlaflosigkeit.

Musik

Michael Jackson wurde schon als kleiner Junge musikalisch stark gefördert. Zusammen mit seinen Brüdern gründete er seine erste Band die „Jackson Five“.

Sein Soloalbum „Thriller“ wird zum weltweit meistverkauften Album.

Sein letztes Album „Invincible“ erscheint 2001.

Seine Bühnen-Abschiedstour konnte nicht stattfinden da er 18 Tage vorher verstarb.



Propofol

Wirkung

- 1 bis 2 Milligramm Propofol pro Kilogramm Körpergewicht führen zur Bewusstlosigkeit innerhalb von zehn Sekunden. Damit ist Propofol ein Narkosemittel.

- Nervenimpulse können durch Propofol nicht weitergeleitet werden können. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gehirnbereichen wird unterbrochen.

Es kann keine Informationsverarbeitung im Großhirn stattfinden. Dies führt zum Bewusstseinsverlust.


Anwendung in der Medizin

- Propofol wird als Gemisch in Wasser und Sojaöl als Narkosemittel verwendet für Kurze Narkosen, zur Einleitung von Narkosen und zur Aufrechterhaltung längerer Narkosen.

- Die Dauer der Narkose lässt sich über die Dosis sehr genau steuern.

- Das Aufwachen aus einer Narkose mit Propofol erfolgt ohne Nebenwirkungen wie z.B. Erbrechen, was bei anderen Narkosemitteln häufig der Fall ist.

Chemische Strukturformel von Propofol



Propofol-Spritze

